



Procédures optionnelles lors de la stérilisation

Sachez que pour chaque patient ayant une anesthésie générale prévue à la clinique, des procédures supplémentaires vous seront proposées le matin-même de la chirurgie. Ces procédures ne sont pas obligatoires, mais sont recommandées par votre équipe vétérinaire. Afin que vous puissiez prendre une décision éclairée, voici en quoi consiste ces procédures.

Implantation de micropuce

La micropuce est une puce informatique de la taille d'un grain de riz, que nous implantons sous la peau de l'animal, entre les omoplates. Cette puce contient un numéro d'identification unique et permanent, détectable à l'aide d'un lecteur de micropuce. Le numéro de série attribué à la micropuce de votre animal, informe le personnel de clinique vétérinaire ou de refuge qui ont votre compagnon devant eux, de la compagnie de micropuce à contacter afin d'obtenir vos coordonnées.

Puisqu'il n'est pas impossible que votre animal prenne la fuite ou se perde, la micropuce est un outil essentiel vous permettant de mettre toutes les chances de votre côté afin de retrouver votre compagnon.

Veillez noter que la micropuce ne contient aucun système de retraçage (GPS) et que certaines municipalités exigent la pose de micropuce pour les animaux de compagnie sur leur territoire.

Bilan sanguin pré-opératoire

Le matin de la chirurgie, votre vétérinaire fera un examen de votre animal afin de s'assurer de sa bonne santé physique. Cependant, cet examen ne permet pas de détecter certaines anomalies pouvant résulter en une contre-indication à l'anesthésie. En effet, seul l'analyse sanguine peut informer votre équipe vétérinaire de conditions tels que, plaquettes sanguines trop basses pouvant causer un trouble de la coagulation, anémie, problématique au niveau des reins ou du foie menant à l'élimination inefficace des produits anesthésiques ou autres maladies asymptomatiques.

Si l'analyse sanguine révèle des anomalies mineures, l'équipe peut réaliser la chirurgie en prenant des précautions particulières supplémentaires : fluides intraveineux, protocole anesthésique adapté, mise en place d'un traitement parallèle etc.

Le bilan sanguin sera toujours conseillé, ne serait-ce que pour avoir l'heure juste sur la santé globale de votre compagnon et de prévenir les maladies, peu importe son âge.

Test Ortolani et radiographie des hanches

Si votre chien pèse plus de 10 kg, votre vétérinaire profitera de l'anesthésie lors de sa stérilisation pour effectuer un test physique au niveau de la hanche. Ce test se nomme Ortolani et est effectué de façon systématique et sans frais le jour de la chirurgie. Il permet de détecter une laxité anormale au niveau de l'articulation de la hanche, et peut seulement être réalisé sous anesthésie ou à l'aide d'une sédation profonde.

Si le test s'avère négatif, aucun frais supplémentaire n'est ajouté à votre facture, et nous pouvons nous réjouir de la santé des hanches de votre compagnon ! Si, toutefois, une laxité est détectée au niveau d'une des deux hanches, ou les deux, il est possible que cela soit un signe d'une condition nommée dysplasie de la hanche. Il est alors recommandé de

procéder à une radiographie du bassin de votre compagnon pendant l'anesthésie. Le frais de celle-ci inclus la révision de la radiographie par un spécialiste radiologue vétérinaire, qui nous renseignera sur la sévérité de la laxité. Avec cette information, votre équipe vétérinaire pourra vous guider sur l'ensemble des mesures à prendre afin d'aider votre compagnon à bien vivre avec cette condition.

Extraction de dents déciduales (dents de lait)

Tout comme chez l'humain, les dents de lait de votre chien tomberont de façon graduelle, généralement entre l'âge de 4 et 7 mois, et seront remplacées par ses dents d'adulte. Cependant, il arrive qu'une dent d'adulte pousse complètement, mais que son homologue bébé reste en place. Il est donc possible de constater 2 dents au même endroit. Ce phénomène est régulièrement observé chez les chiens de petites races.

Si des dents déciduales sont toujours présentes lorsque votre chiot atteint l'âge de 7 ou 8 mois, nous pouvons être certains qu'elles ne tomberont pas d'elles-mêmes. Ceci occasionnera entre autres, une accumulation plus rapide de tartre et des dents d'adultes mal positionnées. Si votre équipe vétérinaire observe ce phénomène chez votre chien le jour de sa stérilisation, il sera conseillé de procéder à l'extraction des dents déciduales, afin d'éviter la maladie parodontale précoce chez votre compagnon.

Si vous avez des questions supplémentaires concernant ces procédures, n'hésitez pas à nous contacter!